(Parlow & M) Hory come Majorna Pe. 1848.



Из книг д-ра В. С. Сергиева.

1

*

CHOLERA



305754 EP, J



HACTAB JEHIE

ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ КРЕСТЬЯНАМЪ, КАКЪ СЕ-БЯ ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТЪ ХОЛЕРЫ И КАКЪ ВЪ СКОРОСТИ ПОМОГАТЬ ПРОСТЫМИ ДОМАШНИ-МИ СРЕДСТВАМИ, ЕСЛИБЫ ГДѢ ЛИБО ВЪ СЕ-ЛЕНІИ ОТКРЫЛАСЬ ХОЛЕРА.

Наставленіе сіе содержить: а) вообще все то, что надобно знать о холерь; б) міры предосторожности оть холеры, и в) признаки холеры и домашнія снадобья и средства, которыми должно помогать, еслибы паче чаянія укого либо оказалась холера.

- А. О холерь (Cholera-morbus) вообще.
- 1) Предъ наступленіемъ холеры всегда почти и вездѣ между жителями оказывались, какъ бы повально, нѣкоторыя легкія и обыкновенныя бользни, особенно лихорадка (лихоманка, трясучка) и поносы.
- 2) Съ появленіемъ холеры всѣ эти болѣзни сбращались въ холеру, или дѣлались холерою.
- 3) Епрочемъ въ прешлыхъ годахъ (1830 и 1831) на самомъ дълъ видно было, что хелера

есть бользнь повальная и въ началь вовсе неприлипчивая; но тамъ, гдъ не соблюдали правилъ, какъ предохранять себя въ случаъ появленія холеры и не брали тотчасъ мъръ, чтобы обезсилить ее и прекратить, и, гдъ отъ того много сдълалось больныхъ ею, тамъ и холера, какъ и гнилыя горячки, въ особенности еще при тъсномъ помъщеніи больныхъ, становилась заразительною.

- 4) Въ тъ же годы испытано было, что холера тамъ была губительна, гдъ деревни и села лежали въ мъстахъ низкихъ и топкихъ, при болотахъ и нечистыхъ прудахъ, а тъмъ болье, если поселяне при томъ жили тъсно и неопрятно; при такихъ обстоятельствахъ, если оказывалась холера, то одно средство обезсилить ее было то, что жители тъхъ мъстъ выбирались на время изъ жилья и расположились сколь можно просторнъе на мъстахъ возвышенныхъ и сухихъ; такимъ образомъ холера вскоръ потеряла свою силу и прекратилась.
 - 5) Также дознано на самомъ дѣлѣ, что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ при оказавшейся холерѣ жители не теряли бодрости и не унывали, холера была самая слабая, кратковременная, которая вскорѣ, какъ бы сама собою, прекращалась.

Б. Предохранительныя мпъры.

Зная върно все то, что выше въ статьъ А, было сказано о холеръ, необходимо нужно:

1) Беречься вообще отъ простуды, особливо защищать отъ простуды брюхо; и для того:

а) одъваться по времени года, какъ слъдуеть;

б) носить на голомъ брюхѣ кусокъ сукна или байки въ видѣ набрюшника; а гдѣ нѣтъ ни сукна, ни
байки, то кусокъ войлока, или попоны такой величины, чтобы прикрывалъ все брюхо; в) безъ
обуви (босикомъ) отнюдь не ходить; г) на голой
землѣ не ложиться, а также подъ открытымъ небомъ не ночевать.

Сверхъ сего послѣ сна, либо тяжелой работы, когда человѣкъ въ поту, не пить холодной воды, также квасу и инаго холоднаго питья.

- 2) Бсть пишу легкую, умфренно и отнюдь не объбдаться, а паче того не бсть: невыпеченнаго хльба, незрылых яблокь, прогорклаго и кислаго молока, испорченной говядины, несвыжей рыбы, соленых грибовь и вообще соленаго, производящаго большую жажду; равнымъ образомъ не пить стоячей или затхлой воды, перекисшаго кваса, въ особенности ничего много, тымъ болье, не напиваться до пьяна; словомъ: лучше ъсть и пить ньсколько разъ въ день по немногу, нежели однажды и досыта.
- 3) Содержать каждому какъ около себя, такъ и жилья своего, а тъмъ паче въ самомъ жильъ, чистоту и опрятность; а потому не имъть вблизи дома помойныхъ ямъ, отхожихъ мъстъ, кучъ гніющаго сора и проч., въ самомъ жильъ не держать вмъстъ съ собою домашній скотъ и птицу,

какъ это въ нѣкоторыхъ деревняхъ водится, да и самимъ жить сколько можно просторнѣе; сверхъ того, освѣжать почаще воздухъ, отворяя въ хорошую погоду окна и двери, а въ ненастье печную трубу, и очищать его куреніемъ, изъ уксуса или кваса, наливая ихъ на горячій кирпичъ.

- 4) Въ покоъ, гдъ находятся больные, не тъсниться; ибо тъсное помъщение увеличиваетъ силу болъзни, и распространение ея на здоровыхъ.
- 5) Буде и затъмъ одинъ за другимъ изъ семьи въ короткое время захвораютъ и болъзнь обнаружится одинаковыми припадками, то хозяинъ дома, ни мало немедля долженъ дать знать старостъ, который обязанъ довести о семъ до свъдънія своего начальства и пригласить ближайшато лекаря; буде же нътъ его, то фельдшера, который приметъ нужныя мъры къ пособію захворавшимъ, также къ предохраненію здоровыхъ отъ бользни, по данной инструкціи.
- 6) Еслибы паче чаянія оказалось, что бользнь, постигшая кого либо въ семьъ, была холера, то и этого не слъдуетъ бояться, или унывать и безпокоиться; ибо нътъ ничего хуже унынія и боязни, такъ какъ все это располагаетъ къ бользни и усиливаетъ ее у занемогшихъ; напротивъ того, бодрость духа и точное исполненіе предписанныхъ здъсь правилъ, служитъ къ охраненію здоровья и къ пресъченію оказавшейся бользни у забольвшихъ.

В. Признаки холеры и домашнія врачебныя пособія.

Признаки холеры.

Холера есть такая болфзиь, отъ которой человъку и здоровому, безъ видимой причины, вдругъ станетъ дурно, потемн бетъ въ глазахъ и послѣ кратковременной дрожи и ворчанія въ кишкахъ, начнетъ рвать и слабить какъ бы водою, а съ этимъ вмъсть слълается сильная сжимаюшая боль полъ грудью и въ лѣвомъ подреберьѣ, принеутолимой жаждъ.

Если таковому больному не будетъ вскорѣ подано пособія, то судороги начинаютъ вести и корчить ноги, а иногда и руки; сдѣлается чрез-

Врачебныя пособія.

Коль скоро въ какомъ домѣ у крестьянина захворають хо-лерою, то тотчасъ же хозяинъ дома долженъ дать знать о томъ старостѣ, а староста извѣстить свое начальство, которое для леченія пригласитъ лекаря, а буде его нѣтъ, то фельдшера. Между тѣмъ до прибытія того или другаго, нимало не теряя времени, поступать съ заболѣвнимъ такимъ образомъ:

- 1) Содержать больнаго въ теплъ и на просторъ, такъ чтобы въ томъ покоъ и около его многіе не тъснились.
- 2) Тереть все тѣло больнаго нагрѣтымъ уксусомъ или виномъ, ноги же, руки и подъ грудью, сверхъ того, чистымъ дегтемъ, а буде имѣется, стручковой водкой.
- 3) Давать почаще и по немногу больному теплаго настоя (чай) изъ мяты, одной, или по поламъ съ ромашкою, или же, если есть подъ руками, отъ 1 до 2

мърная слабость, появится какъ бы предсмертная блъдность, все тъло больнаго и самое дыханіе окажутся холодными, появится икота и другіе припадки, угрожающіе опасностію жизни.

А потому, буде у кого либо изъсемьи посль кратковременной дрожи обморока сдулается такого рода боль подъ ложечкой (душкой) и въ животъ съ тошнотою, рвотою и водянистымъ поносомъ, при измъненіи въ лиць и упадкъ силъ; то навърно полагать можно, что у такого семьянина сдулалась холера.

Хотя сія бользнь по большой части

мятныхъ капель въ водѣ, стирая напередъ хорошо капли съ сахаромъ.

- 4) Буде отъ того нътъ лучше, тошнота и рвота не уменьшаются и боль подъ ложечкой и въ животъ не утихаетъ, то ставить подъложечкою (на душку) горчишникъ, для сего на одну ложку тертой горчицы прибавляется столько холодной воды, чтобы получше растерши чашкъ, сдълалось родъ каши; намазавъ каши сей на чистую тряпку величиною въ ладонь, приложить подъ ложечку и оставлять лежать до красноты; а между тъмъ не переставать продолжать треніе рукъ и ногъ.
- 5) Если и послѣ этого стѣсненіе и боль подъ грудью сильныя, тошнота и рвота не уменьшаются, заболѣвшіе же люди крѣпкаго сложенія, то можно, буде имѣются, припустить піявицы подъ грудью: взрослымъ отъ 12 до 20; а малолѣтнымъ отъ 6 до 10. По отпаденіи піявиць, припаривать тѣ мѣста, гдѣ онѣ сосали, сѣнною тру-

скоротечна и если забольвшему не подадуть вскоры пособія, опасна и смертельна; но также нерыдко бываеть она и слабышаго дыствія, въ особенности когда занемогшему тотчась окажуть нужную помощь.

Холера есть такая бользнь, отъ которой въ одно время могутъ заболѣть многіе семь в и лаже въ одномъ домъ; но такъ напримфръ: въ одномъ и другомъ концахъ деревни окажутся заболвьшіе холерою, а въ срединъ деревни и даже въ

кою, которую передъ тъмъ должно обварить кипяткомъ.

6) Буде же занемогщіе холерою люди слабые, или прежде того изнурены какимъ либо недугомъ, то таковымъ безъ лекаря піявицъ припускать не надобно, а продолжая тренія и другія пособія, о коихъ выше было сказано, въ замънъ обыкновенной бани (*), дълать нъсколько разъ паровую ванну; для сего, если нътъ кровати съ веревчатымъ переплетомъ, то на двухъ обыкновенныхъ скамейкахъ размъстить такъ доски, чтобы между ними могъ свободно проходить паръ. На таковой приборъ переложа больнаго и накрывъ его до низа одъяломъ, комъ, или за неимѣніемъ того и другаго, шубою, попоною или тому подобнымъ, производить подъ нимъ уксусные пары, наливая по немногу на горячіе

^(*) Обыкновенною банею пользоваться тогда, если она отъ жилья не въ дальнемъ разстояніи, на этотъ случай вытоплена, и имѣетъ всѣ удобства къ тому, чтобы по выходѣ изъ оной, не простудить больнаго.

сосъднихъ домахъ ни одного не захвораетъ ею; изъ этого видно, что холера незаразительна и неприлипчива, и только, какъ уже выше сказано, можетъ обратиться въ заразительную, если не будутъ исполнять предписанныхъ здёсь правилъ, какъ охранять себя отъ холеры и темъ допустять, чтобы многіе въ семьъ захворали, но если ужъ это случится и особливо, когда въ семь кто либо умретъ отъ холеры, то лучше выбраться въ другой домъ, или дасарай ВЪ на же возвышенномъ и открытомъ мѣстѣ, до прекращенія бользни.

кирпичи уксуса или кваса. Средство сіе производя сильную испарину (потъ), весьма часто помогало и укрощало силу болъзни; но тамъ, гдъ и сего средства имъть не можно, то обложить все тело больнаго нагретымъ пескомъ. А между тъмъ въ покоъ содержать чистоту и опрятность; не тъсниться и освъжать воздухъ, отворяя печную трубу, а также очищать его, куря чаще въ немъ уксусомъ, либо квасомъ, наливая ихъ, какъ выше было сказано, по немногу на горячій кирпичъ.

Пищи доколь самъ больной не пожелаеть, никакой ему не давать, а еслибы попросиль, то давать самую легкую, напримёрь: жидкую похлебку, приготовленную изъ цыплять, либо баранины, или уху изъ свъжей мелкой рыбы, буде имъется; либо просто жидкую овсяную кашицу съ малымъ количествомъ свъжаго коровьяго масла; ибо възтой бользни желудокъ иной пищи, тъмъ паче грубой или сырой переносить не можетъ; так-

же для питья давать по немногу слабаго отвара изъ ячменя, либо молока изъ мака, буде оное имъть можно, или же простуженнаго жидкаго настоя изъ мяты и ромашки.

Примъчаніе. Въ настоящую эпидемію во многихъ случаяхъ холеры, для спасенія заболѣвавшихъ достаточнымъ оказалось:

- а) Намазывать руки и ноги больнаго смѣсью изъ чистаго дегтя, хлѣбной водки и порошка обыкновенной горчицы: (дегтю чистаго 1 бутылка, вина хорошаго хлѣбнаго 1 большой стаканъ, горчицы мелко истертой ½ фунта); все сіе хорошо перемѣшать и намазывать рукою. Опытъ доказаль, что для унятія судорогь, это средство весьма много помогало.
- б) Давать мятныхъ капель съ сахаромъ и водою нѣсколько въ увеличенномъ пріе́мѣ, нежели какъ объяснено на стр. 5-й (ст. В. п. 3).
- в) Натирать животъ около пупа хлъбною водкою, смъщанною съ обыкновеннымъ перцомъ: (хлъбнаго 3 пробнаго вина 1 стаканъ, перцу мелко истолченнаго и просъяннаго 1 столовая (хлебальная) ложка; все сіе хорошо перемъщавши натирать означенныя мъста, и потомъ наложить ветошку и обвязать животъ.
- г) Примачивать грудь, подъ ложечкою (душку) и голову примочкою: изъ уксуса, водки и розовой воды (уксусу виннаго, вина хорошаго хлъб-

наго, воды розовой либо настоя изъ розовыхъ цвътовъ (чай), того и другаго по одной бутылкъ); все сіе хорошо перемъщавши, намачивать посредствомъ ветошки, либо хлопчатой бумаги, помянутыя мъста, до 3 разъ и болье. Дъйствіе этого средства было то, что оно уменьшало внутренній жаръ и успокоивая больнаго, производило благотворный сонъ.

Весьма немногимъ по прошествій опасныхъ припадковъ бользни было нужно давать для укрѣпленія желудка настойки изъ ирнаго корня и полынной травы по 1/4 фунта, хлѣбнаго хорошаго вина 1 бутылка), что настоявъ въ теплѣ въ продолженій сутокъ, давать пить два раза въ день по 1/2 рюмки.

MHCTPYKIIA

ФЕЛЬДШЕРУ, ДЛЯ ПОДАВАНІЯ ВРАЧЕБНАГО ПОСОБІЯ ЛЮДЯМЪ, ЗАБОЛЪВШИМЪ ХОЛЕРОЮ, ТАМЪ, ГДѢ НѢТЪ ЛЕКАРЯ.

Коль скоро фельдшеръ извъщенъ будетъ о захворавшемъ холерою, то онъ обязанъ перекинувъ черезъ плечо съ лекарственными припасами сумку, тотчасъ прибыть въ тотъ домъ, гдъ оказалась холера и, удостовърясь на мъстъ, что уже все то испытано домашними больнаго, что предписано въ наставленіи крестьянамъ, не исключая и средствъ, служащихъ къ очищенію воздуха, но безъ особаго успъха, поступаетъ такимъ образомъ:

1) Если захворавшему приключилась холера вскоръ послъ обыкновенной простуды, то онъ употребляя для облегченія страданій больнаго, смотря по надобности, мягчительныя и болеутолительныя средства, даетъ почаще и по немногу теплаго отвара изъ корня просвирьняка (R. Althacae) или теплаго же настоя (чай) изъ травы просвирки (Herb. Malvae) одного или съ опійными каплями, либо буде есть въ готовности, то отваръ ячневый съ мятными и опійными каплями; (опій-

ныхъ капель на пріемъ отъ 5 до 10, а мятныхъ, которыя предварительно стираются съ сахаромъ, отъ 1 до 2); а между тѣмъ дѣйствуетъ всѣми мѣрами къ произведенію испарины у больнаго треніемъ тѣла его теплыми: простымъ или камфорнымъ уксусомъ, обыкновенными ваннами, либо ароматическими съ сѣнною трухою, коихъ однако же температура не должна быть ниже 28° по Реомюрову термометру, а за неимѣніемъ для производства ваннъ нужнаго, уксусными парами, направляемыми къ больному, какъ то выше изъяснено въ наставленіи крестьянамъ. (Ст. В. п. 6.)

2) Если холера приключилась человѣку отъ чрезмърнаго отягощенія желудка нездоровою пищею или просто отъ обжорства, либо пьянства, или даже отъ гнъва и испуга, то онъ употребляя -для каждаго таковаго больнаго, смотря по надобности, приличное средство, которое однако выводило бы легко изъ желудка накопившіяся нечистоты и желчь, какъ наприм. касторовое масло, или очищенное льняное и т. п., либо дъйствуя только всасывающими средствами (absorbentia), какъ то: порошкомъ угля и магнезіи въ ароматной водь, продолжаеть безостановочно употреблять всё тё наружныя тренія и раздражающія кожу лекарства, которыя служать вообще къ отведенію бользнетворнаго начала отъ частей внутреннихъ къ наружнымъ; и для того, кромѣ тренія уксусомъ, стручковою водкою и т. п. назначаетъ прикладывать къ рукамъ и ногамъ больнаго нагрътые и обвернутые въ холстину кирпичи, кувшины съ горячею водою и т. п., приготовляя между тъмъ самъ горчишники, или и шпанскія мушки къ помянутымъ мъстамъ больнаго, или и къ инымъ, гдъ надобность потребуетъ.

3) Буде же бользнь обнаружилась у кого либо безъ вышеуказанныхъ причинъ, то съ употребленіемъ наружныхъ раздражающихъ и отводящихъ средствъ, долженъ онъ фельдшеръ, давать больному внутрь лекарства противусудорожныя и болеутолительныя, смотря по преимущественной въ тъхъ или другихъ надобности: сюда относятся настои (infusa) мяты и мауна, мятная эссенція, опійныя капли и самый опій; или уголь, магнезія; либо каломель совокупно съ всасывающими и опіемъ.

Опійныя капли назначаются тогда, когда внутреннія судороги не уступаютъ легчайшимъ противусудорожнымъ средствамъ; ихъ можно давать отъ 10 до 25 капель и болѣе, въ ложкѣ мятной воды, или слизистаго отвара: ячменнаго, овсянаго, либо приготовленнаго изъ корня просвирьняка (R. Althaeae).

Опій въ порошкѣ имѣетъ мѣсто въ сильныхъ судорогахъ внутреннихъ, съ болью во внутренности при упорныхъ рвотѣ и поносѣ; его даютъ больному на пріемъ отъ 1 до 2, 3 и болѣе гранъ.

Каломель употребляется, когда, по достаточномъ отвлечении крови, внутренния боли такъ сильны, что угрожають опасностію не минуемаго воспаленія; его дають оть 8 до 10 и болье грань на пріємь каждые два или 4 часа. Въ случав изверженія сего средства рвотою, можно смышивать оное съ медомь и намазывать на языкъ больнаго.

Вообще же во всъхъ сихъ случаяхъ холеры, при неимъніи врача, вниманіе фельдшера должно быть обращено на слъдующее:

- а) Если занемогшій холерою чувствуєть такое сжатіє и боль подъ грудью, что оныя затрудняють свободное дыханіе, а при томъ сей захворавшій отъ природы крѣпкаго сложенія и полнокровенъ, то въ такомъ случав съ самаго начала кинуть кровь: взрослымъ отъ 1 до 2 фунтовъ; а малольтнымъ отъ 4 до 6 унцій, и какъ кровь въ этой бользни отъ густоты своей, или особеннаго качества, либо отъ судорожнаго сжатія сосудовъ, при самой лучшей венесекціи, часто не вытекаетъ изъ жилы, или выступаетъ только каплями, то иногда нужно напередъ употребить раздражающія тренія или сдълать ручныя ванны (maniluvia) съ горчицею и солью.
- б) Если же захворавшій будеть оть природы человькь слабый, или изнурень уже прежде какими либо недугами; то таковому достаточно припустить подъ грудью піявицы или поставить рожки: взрослымь, піявиць оть 15 до 25, а рожковь оть 4 до 6; малольтнымь же, смотря по возрасту, піявиць оть 6 до 10, а рожковь оть 2 до 4.

За всёмъ симъ и при благопріятномъ по видимому исходѣ холеры, болѣзнь сія оставляетъ за собою нервныя и тифозныя горячки, поносы, а также нѣкоторые другіе не маловажные недуги. — Какъ въ этихъ случаяхъ поступать, излагается въ сельскомъ лечебникѣ, изданномъ для государственныхъ крестьянъ; въ обыкновенной же слабости послѣ сей болѣзни можно давать, для подкрѣпленія силы больнаго, чрезъ нѣкоторое время отвара проскурнячнаго или салепнаго корня, примѣшивая къ онымъ отвара корня ирнаго или горячавки и нѣсколькихъ гофманскихъ капель.

По укрѣпленіи такимъ образомъ послѣ сей болѣзни, нужно совѣтывать выздоровѣвшимъ беречься отъ грубой пищи, перекислаго кваса и особенно отъ излишества хмѣльныхъ напитковъ.

The same of the sa The second of th THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE M3 WHIST A- FIZ B. C. CEPTIVEBIA. Franklin in CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE







A DAN